



月度风险评估

2019年第1期（总第55期）

六安市卫计委应急办主办

六安市疾病预防控制中心应急办承办

2019年1月7日

六安市 2019 年 1 月份突发事件公共卫生风险评估报告

一、近期概况

突发公共卫生事件管理信息系统: 12 月份全市报告突发公共卫生事件及相关信息 4 起, 发病 151 人, 无死亡。其中一般级别事件 2 起, 发病 74 人, 无死亡, 分别为霍山县诸佛庵中学 1 起诺如病毒感染性腹泻疫情, 霍山县太平畈中心学校 1 起手足口病疫情; 未分级事件 2 起, 发病 77 人, 无死亡, 分别为金安区水痘疫情 1 起, 裕安区流行性腮腺炎疫情 1 起。

二、风险评估结果既建议

(一) 特别关注事件

无

(二) 重点关注事件

1、流感

全国疫情概况: 2018 年 12 月 (第 49-52 周), 全国流感

监测哨点医院流感样病例百分比（ILI%）在 3.3%-4.1%之间。

12 月全国共计检测流感样病例标本 33845 份，阳性标本 4785 份，阳性率为 14.1%。阳性标本中，4272 份为甲型 H1N1 型（占 89.3%），468 份为季 H3 型（占 9.8%），37 份为 B 型 Victoria 系（占 0.8%），8 份为 B 型 Yamagata 系（占 0.2%）。

12 月份，全国共计报告流感样病例暴发疫情 511 起，其中甲型 H1N1 型为 259 起（占 50.7%），季 H3 型 65 起，混合型 20 起，B 型 3 起，流感病毒阴性 29 起，其他病原 2 起，其余 133 起检测结果未知。

安徽省疫情概况：2018 年 12 月，全省流感监测哨点医院流感样病例百分比（ILI%）在 2.8%-3.2%之间，平均水平高于上个月（2.7%-2.8%）。12 月全省共计检测流感样病例标本 2469 份，阳性标本 127 份，阳性率为 5.1%，显著高于上个月水平（0.3%），其中 96 份为甲型 H1N1 型（占 75.6%），24 份为季 H3 型（占 18.9%），7 份为 B 型 Victoria 系。

2018 年 12 月，我市流感网络实验室共检测流感样标本 135 份，未检测出阳性标本。2019 年开始截至 1 月 7 日，我市流感网络实验室共检测流感样标本 65 份，检测出 13 份阳性标本

趋势研判：根据目前流感监测结果，我市流感病毒活动水平逐渐上升，已进入流感流行季，以甲型 H1N1 为主，且流感暴发疫情将可能继续发生，发生场所主要为中小学、托幼机构。

对策与建议：（1）学校切实落实学生的晨午检和因病缺

课登记工作，做到流感样病例早发现、早报告，一旦发现可疑病例，及时引导学生就医，居家隔离休息等；（2）邻近春节放假，人口流动较大，加强对务工返乡人员等流动人口的流感样病例监测工作；（3）加强公众呼吸道疾病预防的宣传教育工作，尤其加强在中小学及托幼机构流感的宣教工作，注意个人卫生、勤洗手、教室勤开窗通风等；（4）加强疫情研判，及时分析疫情态势，加强流感暴发疫情的报告，做好暴发疫情的有效处置和标本采集检测工作；（5）各地应按照《全国流感监测方案（2017年版）》的要求，继续做好流感样病例和病原学监测工作。

2、诺如病毒疫情

我国诺如病毒感染性腹泻疫情呈现逐年上升趋势，2007年-2018年，全国累计报告诺如病毒感染性腹泻疫情849起，报告病例43172例，无死亡；2018年全国共报告诺如病毒感染性腹泻疫情293起，报告病例13383例；2018年全国诺如病毒感染性腹泻疫情基因型主要以GII.P16/GII.2型和GII.P12/GII.3型为主。

2014-2018年12月安徽省于“突发公共卫生事件管理信息系统”累计报告诺如病毒感染性腹泻疫情62起，发病2760人，无死亡，涉及12个地市。其中一般级别事件27起，未分级事件35起；安徽省大数据显示：报告时间集中于11月-次年4月；发生场所主要集中于小学（37.7%）、托幼机构（18.0%）

和高中（14.8%）；传播途径主要为人传人，共46起，占报告事件总数的74.19%。

2018年12月我市报告1起诺如病毒感染性腹泻疫情，发生场所为学校。

趋势研判：根据既往诺如病毒感染性腹泻流行规律，1月份诺如病毒仍处在流行高峰期，上中旬暴发疫情出现的可能性仍然存在，随着下旬学校和托幼机构陆续放假，发生在上述场所的疫情可能会有所减少。

对策与建议：（1）疾病控制机构需按照《诺如病毒感染暴发调查和预防控制技术指南（2015版）》要求，加强疫情监测和分析，及早发现聚集病例和暴发疫情，及时采取控制措施；（2）应加强对学校和托幼机构等集体单位诺如病毒防控知识的宣传教育和预防指导，规范处置病人吐泻物，发生腹泻或呕吐聚集性病例时要立即报告和调查处置。（3）卫生计生行政部门要加强与教育、宣传等部门的合作，充分利用宣传单/宣传栏、电视、网络、微信等多种方式，开展诺如病毒相关知识的宣传，提高群众防病意识。

（三）了解事件

3、水痘、流行性腮腺炎

趋势研判：针对近期我市水痘、流行性腮腺炎疫情频繁发生，特别是冬春季为发病高峰，在学校、托儿所、幼儿园等儿童集中的地方易暴发流行。结合近年我市流行性腮腺炎疫情流

行特征,预测 2019 年 1 月全市流行性腮腺炎发病数将会升高,总体发病水平预计高于去年。

对策与建议: (1) 接种疫苗是预防水痘、流行性腮腺炎最有效的措施,目前普遍使用的是水痘疫苗和麻腮风疫苗。各地要进一步做好常规免疫接种工作,保护易感人群。(2) 发现患者后应立即进行隔离,隔离期一般认为应从起病到临床特征完全消退为止,约三周左右。(3) 开展健康教育和干预,利用各种方式广泛宣传普及水痘、腮腺炎防治知识,提高群众卫生保健意识,加强居民的防范能力。

附件:

风险评估人员

解少煜	市疾病预防控制中心副主任	副主任医师
吕 勇	市疾病预防控制中心急传科	副主任医师
秦 伟	市疾病预防控制中心计免科	副主任医师
徐鹏鹏	市疾病预防控制中心急传科	主管医师
杨 卫	市疾病预防控制中心检验科	主管技师
刘 磊	市疾病预防控制中心职卫科	主管医师
胡颖颖	市疾病预防控制中心急传科	医师
孙 婕	市疾病预防控制中心急传科	医师
龚天麒	市疾病预防控制中心急传科	医师
周 瑜	市疾病预防控制中心急传科	研究生

撰稿: 徐鹏鹏

审稿: 解少煜、吕勇