



月度风险评估

2023 年第 10 期（总第 112 期）

六安市卫健委应急办主办

六安市疾病预防控制中心应急办承办

2023 年 10 月 11 日

2023 年 10 月份突发事件公共卫生风险评估报告

一、近期概况

突发公共卫生事件管理信息系统：2023 年 9 月份全市报告突发公共卫生事件及相关信息 2 起，分别为猴痘暴发疫情 1 起、食物中毒事件 1 起，均为未分级事件。

二、风险评估结果及建议

（一）特别关注事件

无

（二）重点关注事件

霍乱等细菌性肠道传染病

2023 年 9 月，我市无霍乱确诊病例及带菌者报告；报告其他感染性腹泻病例 359 例，较上月（518 例）下降 30.7%，较去年同期（293 例）上升 22.5%；报告细菌性痢疾病例 9 例，较上月（11 例）下降 18.2%，较去年同期（5 例）上升 80%；无报告伤寒/副伤寒病例报告。

趋势研判：根据既往我市细菌性肠道传染病的流行规律，10 月份细菌性肠道传染病报告数可能仍维持在较高水平，不排除出现聚集性疫情或暴发疫情的可能。

对策与建议：（1）各级医疗机构仍需规范开展肠道门诊工作，切实做到“逢泻必登、逢疑必检”，做到“早发现、早诊断、早报告、早治疗”病例。（2）疾控机构继续做好肠道传染病的监测工作，尤其是甲鱼等水产品 and 外环境霍乱弧菌的监测工作，并根据结果适时开展风险评估。（3）一旦出现霍乱疫情，疾控机构需按照《霍乱防治手册（2012 版）》要求，及时做好调查和处置，防止疫情扩散。（4）建议市场监管部门近期进一步强化食品监管工作，对辖区内经营的外来水产品批发、零售摊贩/商户实施进购和销售登记，确保进购地址、数量、产品类型详细，严格落实“索证索票”确保食品可溯源；同时加强对外来水产品，尤其是甲鱼、虾等水产品的抽检工作，确保及早发现潜在带菌水产品，有效管控源头风险。（5）各地需继续加强对霍乱等细菌性肠道传染病的健康宣传工作，引导群众养成良好的饮食卫生习惯，提高公众自我防病意识和就诊意识。

（三）一般关注事件

1. 新型冠状病毒感染

我市新冠病毒感染病例报告情况

2023 年 9 月，我市累计报告新冠病毒感染者 102 例，较上月（161 例）下降 36.6%。

新冠病毒监测情况

2023 年第 36-39 周（9 月 4 日-10 月 1 日）哨点医院 ILI 病例核酸或抗原检测分周阳性率分别为 14.3%、18.4%、9.1%和 13.2%；XBB 及其亚型变异株仍是我市主要的流行毒株，其中 EG.5 变异株占比波动增加。

趋势研判：近期我市新冠网报病例数和哨点医院新冠病毒检测阳性率等指标仍持续下降，总体来看目前全市疫情仍保持零星散发状态，疫情形势总体平稳，但随着秋冬季来临，新冠传播风险可能升高。

对策与建议：（1）持续强化监测预警和疫情研判。继续密切跟踪国内外疫情动态，做好病例报告、哨点医院、病毒变异等相关监测工作，强化疫情形势风险研判，一旦发现预警信号，依规采取必要的应急防控措施。（2）抓好重点场所疫情防控。做好中秋、国庆假期结束后学校健康监测，落实晨（午）检、病例报告等措施，严防校园聚集性疫情；督促养老机构、社会福利机构做好日常防护和健康监测，加强外来人员管理，降低疫情引入传播风险。（3）加强医疗救治能力储备。针对秋冬季可能出现的门急诊患者排队、“一老一小”扎堆就医等情况，做足扩充服务准备，同时加强基层医务人员培训演练，提升新冠诊治能力，落实“四早”要求。（4）继续做好健康宣教工作。通过官方平台持续宣传新冠相关防控知识，引导公众保持戴口罩、勤洗手、常通风等良好卫生习惯，同时及时回应公众关切。

2. 流感

2023 年 9 月，全市报告流感病例 243 例，较上月(195 例)上升 24.6%、较去年同期（698 例）下降 65.2%。第 36 周-39 周（9 月 4 日-10 月 1 日）全市哨点医院通过“中国流感监测信息系统”报告流感样病例（ILI）

872 例，流感样病例占门急诊病例就诊总数比例（ILI%）为 4.3%，较上月（3.72%）上升 0.58%。全市哨点医院共采集流感样病例标本 302 份，检测出阳性标本数 9 份（均为 A 型 H3N2 亚型），阳性占比 2.98%。

2023 年 9 月，全市无流感聚集性/暴发疫情报告。

趋势研判：根据全市流感监测结果，目前我省流感病毒活动水平呈上升态势，且以甲型流感为主。根据以往我市流感流行特征，进入秋季，昼夜温差较大且天气多变，流感病例数和流感病毒阳性检出率可能会逐渐上升。且随着天气转冷，教室通风不畅，未来一段时间内学校流感样病例暴发疫情可能会有所增多。

对策与建议：（1）落实教育、卫生等部门的联防联控机制，学校要严格落实学生晨午检、因病缺勤缺课登记追踪制度，及时发现校园早期流感病例，防止疫情规模扩大。（2）各地要认真做好秋冬季流感疫苗接种工作，建议所有 ≥ 6 月龄且无接种禁忌的人接种流感疫苗，尤其是老人、儿童、慢性基础性疾病患者以及医务人员等重点人群。（3）各流感监测单位要继续做好流感监测和疫情风险研判工作，辖区内一旦出现流感样病例暴发疫情，应按照相关方案的要求，及时规范处置疫情。（4）各地广泛开展流感健康知识宣传，使广大公众养成良好的个人卫生习惯，提高自我防病意识。

3. 诺如病毒感染性腹泻

2023 年 1 月 1 日-10 月 10 日，我市共报告诺如病毒感染疫情 1 起，为未分级事件，疫情发生在托幼机构。

趋势研判：我市诺如病毒的流行季节为 10 月至次年 3 月，因此 10 月学校和托幼机构出现诺如病毒感染暴发疫情的风险增加。

对策与建议：（1）卫生健康部门应加强与教育机构、卫生监督、食品药品监督管理局等部门沟通与协调，及时通报工作信息，进一步完善联防联控工作机制。（2）学校、托幼机构要严格落实晨午检和因病缺勤登记制度，同时在流行季节加强对教师、医务人员等的培训工作，发现疑似病例要及时上报，并做好呕吐物、粪便的消毒工作。（3）医疗机构应加强医务人员的培训工作，提高敏感性和上报意识，做好病例救治、隔离和感染控制。（4）疾病预防控制机构需加强疫情监测和分析，及早发现聚集性和暴发疫情苗头，适时开展疫情趋势研判，规范疫情现场处置工作。（5）各地应加强诺如病毒感染防控知识宣传，提高公众、社区和集体单位的防控意识，倡导养成良好的卫生和饮食习惯。

4. 猴痘

2023 年 9 月，我市报告猴痘病例 1 例，为确诊病例，无死亡。

趋势研判：目前所有病例均在男男同性性行为人群中发现，在该人群容易造成多链条隐匿传播，我市持续面临猴痘疫情输入及本地传播风险，但由该类人群引起一般人群规模性传播和流行的可能性较小。

对策与建议：（1）建议各地完善联合调查机制。在病例流调过程中，可由艾防、传染病防治等业务人员成立联合调查组，积极推动各类社会组织或 MSM 志愿者共同参与。（2）加强密接追踪管理。发挥多部门联防联控的协同作用，掌握、追踪和管理密切接触者，指导密切接触者做好医学观察；密切接触者医学观察监测期间须避免与他人发生性接

触，减少非必要的外出；医学观察监测期间，如出现任何急性症状或体征等不适表现者，应及时前往指定医疗机构就诊并主动报告可疑接触史。

(3) 加强医院和疾控机构人员培训。提高医务人员早期发现病例的意识、能力和诊疗水平，提高疾控人员监测、流行病学调查、消毒处理和实验室检测能力。(4) 加强重点人群检测动员。猴痘疫情发生所在县区，应及时公布当地免费采样机构和地点，同时通过互联网、同伴教育、外展活动等多种形式开展重点人群猴痘检测动员。(5) 加强重点人群健康干预。在男男同性性行为人群中加强传染病法制宣传，针对其常用社交软件或网络渠道进行定点宣传投放，在酒吧、浴室等重点人群聚集场所开展猴痘线下宣传等干预措施，提高重点人群的自我监测和主动就诊水平。(6) 积极做好舆情监测工作。加强猴痘相关舆情监测，及时掌握舆情动态，积极回应社会关切的热点问题，加强正面引导，避免出现不良舆论影响。

5. 手足口病

2023 年 9 月全市共报告手足口病病例 212 例，较上月（393 例）下降 46.1%，较去年同期（199 例）上升 6.5%。2023 年 9 月全市无手足口病暴发疫情报告。

趋势研判：根据我市既往手足口病流行特征，10-12 月为手足口病的流行小高峰，预计 10 月报告病例数可能有所增加，学校和托幼机构等集体单位出现聚集性/暴发疫情的风险增加。

对策与建议：（1）各级医疗机构要强化医务人员培训，早期识别和报告手足口病病例，加强病例救治工作，严格执行传染病预检分诊制

度，做好院内感染控制工作。（2）疾病预防控制机构要加强监测和分析，进一步规范标本采集和数据报送工作，做好辖区内重症和死亡病例的流行病学调查和病原学检测工作，根据疫情防控工作的需要，适时开展风险评估。（3）疾病预防控制机构需按照《手足口病聚集性和暴发疫情处置工作规范（2012 版）》要求，及时开展聚集性和暴发疫情处置，防止疫情扩散。（4）加强健康教育工作，充分利用海报、视频和微信等多种方式宣传手足口病的预防知识，提高公众自我防护意识。

6. 恙虫病

2023 年 9 月，我市共报告恙虫病病例 34 例，较上月（12 例）上升 183.3%，较去年同期（9 例）上升 277.8%，无死亡病例报告。

趋势研判：根据我市恙虫病既往流行规律，10-11 月份为我市恙虫病的流行高峰，预计 10 月份将出现较多病例报告，不排除出现聚集性疫情的可能。

对策与建议：（1）加强病例诊断和规范性治疗。各级医疗机构应开展医疗卫生专业人员培训工作，提高病人的发现和治疗能力。（2）加强宿主动物和媒介生物的控制工作。恙虫病多发地区可采取爱国卫生运动，铲除居住地或工作地及其周边地区的杂草，以消除恙螨的孳生地；鼠密度高的居民区采用投放鼠药、布鼠夹等方式进行灭鼠，减少宿主动物感染机会。（3）积极开展健康教育，广泛宣传恙虫病的防治知识，提高公众自我保护意识和水平，野外劳作时做好必要的个人防护，一旦出现发热等疑似症状后及时就医，并将相关暴露史告知医生。